

ПРОГНОЗ **фітосанітарного стану та рекомендації щодо захисту основних** **сільськогосподарських рослин у господарствах Чернівецької області** **в серпні 2026 року**



Тепла та помірно волога погода, яка переважала в липні, сприяла активному росту та розвитку сільськогосподарських рослин, поширенню хвороб та шкідливості фітофагів.

Подальше підвищення температурного режиму і зменшення продуктивної вологи в ґрунті негативно позначиться на вегетуючих рослинах, спричинивши передчасне дозрівання та зменшення врожайності.

Кукурудза

Протягом серпня в посівах кукурудзи продовжуватиме шкодити стебловий (кукурудзяний) метелик.

В районах поширення відбуватиметься літ, спарювання та яйцекладка карантинного шкідника - західного кукурудзяного жука. Імаго пошкоджуватимуть волоть, стовпчики жіночих суцвіть, листя та, за великої чисельності, обгризатимуть молоді качани. Яйцекладка триватиме до кінця серпня.



Злакові попелиці, гусениці бавовникової та інших листогризух совок шкодитимуть осередково, не наносячи значних пошкоджень посівам кукурудзи. Обприскування інсектицидами доцільне за перевищення ЕПШ у

відповідності до регламентів існуючих технологій та санітарних вимог. За умов достатнього і надмірного зволоження та підвищених температур у посівах кукурудзи можливе поширення гельмінтоспоріозу.



На присадибних ділянках на поодиноких рослинах можливий розвиток пухирчастої та летучої сажки. Пошкодження качанів гусеницями стеблового кукурудзяного метелика сприятиме розвитку та поширенню фузаріозу.

Соя

Найбільш шкодочинними у період формування – дозрівання бобів сої будуть павутинні кліщі. В осередках можлива поява вогнищ підвищеної чисельності гусениць листогризучих совок, лучного метелика та чортополохівки. Повсюди на поодиноких рослинах шкодитимуть попелиці та трипси.

Захисні обробки проводять лише за надпорогової чисельності шкідників (листогризучі совки 1-3 гусениці на кв.м, лучний метелик 4-5 гусениць на кв.м, тютюновий трипс 10-15 екз. на рослину) дозволеними до використання інсектицидами.



Із збільшенням посівних площ в області відбувається подальше накопичення інфекції в ґрунті. За теплої та вологої погоди посиляться розвиток пероноспорозу, антракнозу, аскохітозу, бактеріозу, церкоспорозу, гнилей та інших хвороб. Повсюди у посівах сої ймовірний розвиток фузаріозного в'янення, прояв якого вже відмічено в Чернівецькому районі. Поширення вірусних хвороб відбуватиметься на площах, заселених сисними шкідниками.

За 14 днів до збирання урожаю (за вологості насіння не більше 35-40%) проти гнилей проводять обробки посівів сої дозволеними десикантами.

Соняшник

Шкідники значної шкоди рослинам соняшнику завдавати не будуть. Більшу загрозу за теплої, з підвищеною вологістю погоди становитимуть хвороби – перш за все, гнилі (біла та сіра), а також пероноспороз, фомоз, іржа, септоріоз та аскохітоз.

За високої вологозабезпеченості ($ГТК > 1,5$) і вологості насіння 25-30% на початку побуріння кошиків доцільно планувати проведення десикації посівів дозволеними препаратами.

Картопля та овочі

В поточному році спостерігається збільшення чисельності та шкідливості колорадського жука літнього покоління. Рослини пізньостиглих сортів картоплі продовжують пошкоджувати жуки та личинки різних віків. Відбувається заселення посадок томатів та баклажанів.

В серпні інтенсивний розвиток альтернаріозу, фітофторозу, макроспоріозу та чорної бактеріальної плямистості пасльонових культур ймовірний в разі підвищеної вологості (короткочасних дощів, рясних рос) та помірних температур повітря. За високої вологості повітря, частих дощів, тривалих туманів ймовірний епіфітотійний розвиток фітофторозу. За жаркої та сухої погоди розвиток вищезазначених хвороб призупиниться, але посилення випаровування вологи із листя, обумовлюючи відтік із плодів, спричинить розвиток верхівкової гнилі.

Попелиці (переносники вірусних інфекцій) сприятимуть подальшому поширенню вірусних хвороб пасльонових культур.



Рослинам капусти середніх та пізніх строків дозрівання завдаватимуть шкоди гусениці капустиної совки, біланів, молі та білокрилка. Зростанню чисельності та шкідливості попелиці сприятиме тепла, помірно волога погода.

Розвиток і поширення судинного та слизового бактеріозу, осередково фомозу та альтернаріозу, ймовірний за різких добових перепадів температури і підвищення вологості повітря.

Пізні сорти капусти за потреби продовжують захищати дозволеними до використання інсектицидами. Товарні посіви пізньої капусти від хвороб (пероноспороз, альтернаріоз, фомоз, фузаріозне в'янення, гнилі, інші) обприскують дозволеними фунгіцидами. Всі рекомендовані препарати варто

застосовувати разом з прилипачами. Це зменшить витрату робочого розчину та підвищить ефективність захисту рослин капусти.

Нагадуємо, що для захисту рослин на присадибних ділянках необхідно застосовувати лише ті пестициди, які дозволені для роздрібного продажу населенню.

Яблуня

У яблуневих садах триватиме літ, яйцекладка 2-го покоління та шкідливість личинок 1-го та 2-го поколінь яблуневої плодожерки.

За жаркої та сухої погоди особливо небезпечними будуть сисні шкідники: зелена яблунева, плодові кліщі, щитівки і несправжні щитівки.



В осередках заселення кров'яною попелицею доцільна обробка інсектицидами: Мовенто 100, КС, 2,0-2,25 л/га + Липосам 0,5-1,0 л/га, Сіванто прайм 220 SL, РК 0,75-1,0 л/га + Липосам 0,5-1,0 л/га або Трансформ, ВГ 0,1 кг/га + Липосам 0,5-1,0 л/га.



За помірної вологості повітря в насадженнях зерняткових дерев продовжуватиме розвиватись парша та плодова гниль. В кінці серпні – на початку вересня зимові сорти яблуні не пізніше, як за 20 днів до початку збирання врожаю, проти парші, плодової гнилі, інших хвороб плодів під час

зберігання обприскують дозволеними фунгіцидами.

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області нагадує, що Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні розміщений на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (посилання - <http://surl.li/iiada>).

При роботі із засобами захисту рослин слід дотримуватися діючих Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 8.8.1.2.001-98, регламентів застосування препаратів та правил техніки безпеки.